



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Département des urgences sanitaires

EBOLA - récapitulatif
09.09.2014

Une épidémie de maladie à virus EBOLA touche actuellement l'Afrique de l'Ouest : Guinée, Liberia, Sierra Leone et Nigeria. Par ailleurs, une épidémie distincte a été détectée en République démocratique du Congo.

- Il n'y a, à ce jour, aucun cas d'Ebola diagnostiqué hors d'Afrique.

TRANSMISSION

Le virus Ebola se transmet d'homme à homme par **contact direct** avec un liquide :

- des fluides corporels tels que le sang, la salive, l'urine, le lait maternel, le sperme, la sueur, les selles et les vomissements des personnes infectées, vivante ou non ;
- des objets (comme des aiguilles souillées) qui ont été contaminés par les fluides corporels de patients infectés malades.

- Il n'y a pas de transmission du virus :
 - avant l'apparition de symptômes
 - ou s'il n'y a pas de contact physique (accueil, lieu public...) avec un malade
 - ou par l'échange d'argent ou de marchandises (hors viande de brousse).

SYMPTOMES

- Apparition brutale d'une fièvre élevée ($> 38,5^{\circ} \text{C}$),
- douleurs articulaires, musculaires,
- maux de tête,
- importante fatigue générale.

En 3 à 4 jours, apparaissent d'autres symptômes au niveau de la peau et des muqueuses (conjonctivite, éruption cutanée, difficulté à avaler) et digestifs (diarrhée, vomissements).



MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Département des urgences sanitaires

QUELLE CONDUITE ADOPTER FACE A UNE PERSONNE QUI POURRAIT ÊTRE PORTEUSE DU VIRUS EBOLA ?

Cas 1 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria, de la Sierra Leone ou de République démocratique du Congo, depuis plus de 21 jours

- **Aucune mesure spécifique.**

Cas 2 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria, de la Sierra Leone ou de République démocratique du Congo, depuis moins de 21 jours et ne présente pas de fièvre ni de symptôme.

Il lui est conseillé de surveiller sa température pendant 21 jours et d'appeler le SAMU-CENTRE 15, en cas d'apparition de symptômes.

- **Aucune autre mesure spécifique.**

Cas 3 : La personne revient de Guinée, du Libéria, du Nigeria, de la Sierra Leone ou de République démocratique du Congo, depuis moins de 21 jours **ET** présente une fièvre supérieure à 38,5°C (voire d'autres symptômes).

- Cette personne est définie comme un « cas suspect ».
- Il convient alors d'APPELER LE SAMU-CENTRE 15 et en attendant :
 - Isoler la personne dans un espace clos,
 - Demander à la personne de porter si possible un masque chirurgical (ou au minimum un mouchoir) couvrant la bouche et le nez pour éviter la propagation de gouttelettes,
 - Limiter le nombre de personnes présentes à proximité,
 - Éviter tout contact physique avec la personne et se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique.